

# Dix-sept chameaux (et plus)

Philippe Langlois(\*) et Julien Moreau(\*\*)  
sur une idée de Simon Agou

## 1. Introduction : un célèbre conte oriental

*Ce conte est souvent attribué à Nasreddin Hodja, personnage plus ou moins mythique qui aurait vécu dans la Turquie du XIIIe siècle. Mais il pourrait être plus ancien.*

Un bédouin laissa dix-sept chameaux en héritage à ses trois fils. Selon son testament, la moitié revenait à l'aîné, le tiers au second fils et le neuvième au plus jeune. Ne pouvant s'entendre sur la façon de procéder au partage, les frères allèrent consulter un sage<sup>(1)</sup>. Celui-ci, après mûre réflexion, leur dit : « Je vais vous prêter un de mes chameaux et vous verrez que tout ira bien. » L'aîné eut alors la moitié de dix-huit chameaux, soit neuf, le second en eut le tiers, donc six, et le dernier le neuvième, donc deux, soit en tout dix-sept. Et le sage put reprendre le chameau prêté.

Le partage se fit donc selon la formule  $9 + 6 + 2 + 1 = 18$ , qui s'écrit aussi

$$\frac{1}{2} + \frac{1}{3} + \frac{1}{9} + \frac{1}{18} = 1.$$

## 2. Interprétations arithmétiques et généralisation

Ce problème peut être mathématisé et généralisé de deux façons équivalentes.

**Forme 1 :** Écrire 1 comme somme de fractions « égyptiennes » (c'est-à-dire de numérateur 1) deux à deux distinctes, dont les dénominateurs divisent tous celui,  $n$ , de la dernière. Une telle écriture de 1 sera appelée ici une écriture  $(E_n)$  ... terme absolument pas canonique.

**Forme 2 :** Écrire un entier  $n$  comme somme d'un certain nombre de ses diviseurs stricts parmi lesquels figurera obligatoirement 1.

◆ Explicitons ces deux propriétés.

La première s'écrit  $\frac{1}{p_1} + \frac{1}{p_2} + \dots + \frac{1}{p_k} + \frac{1}{n} = 1$ , avec  $p_1 < p_2 < \dots < p_k < n$  et les  $p_i$

divisant tous  $n$ .

La seconde s'écrit  $q_1 + q_2 + \dots + q_k + 1 = n$  avec  $q_1 > q_2 > \dots > q_k > 1$ , les  $q_i$  étant tous des diviseurs de  $n$  (évidemment stricts puisque leur somme est  $n - 1$ ).

On passe de la première à la seconde en posant  $q_i = n/p_i$  pour  $1 \leq i \leq k$ , de la seconde à la première en posant  $p_i = n/q_i$  pour  $1 \leq i \leq k$ .

(\*) philippe.r.langlois@gmail.com

(\*\*) julien.e.moreau@gmail.com

(1) Selon certains auteurs, ce sage aurait été Ali, le gendre du Prophète.

**Remarque** : On voit immédiatement sur la forme 2 que, si  $n$  est premier, il n'y a pas d'écriture ( $E_n$ ).

### 3. Exercices

*Existe-t-il au moins une écriture ( $E_{30}$ ) ? une écriture ( $E_{52}$ ) ?*

◆  $30 = 2 \times 3 \times 5$  ; ses diviseurs stricts sont 1, 2, 3, 5 et leurs produits deux à deux, 6, 10, 15. La somme des termes de cette liste est 42 ; pour avoir une somme de 30, il faut retirer des termes de somme 12 (mais on ne doit pas retirer 1). Une solution est de retirer le couple (2, 10) :  $30 = 15 + 6 + 5 + 3 + 1$ , d'où

$$1 = \frac{1}{2} + \frac{1}{5} + \frac{1}{6} + \frac{1}{10} + \frac{1}{30}.$$

Montrons que cette solution est la seule : on doit trouver dans la liste 15, 10, 6, 5, 3, 2 des termes de somme 12. Sont évidemment exclus 15 et 10 (ce dernier donnant la seule solution 10 + 2) ; restent 6, 5, 3, 2 avec lesquels on ne peut réaliser 12.

◆  $52 = 2 \times 2 \times 13$  ; les diviseurs stricts sont 1, 2, 4, 13, 26 de somme 46 ; on ne peut donc pas trouver une somme partielle égale à 52. Il n'y a pas d'écriture ( $E_{52}$ ) .

### 4. Écriture ( $E_n$ ) à trois fractions

*Peut-on écrire 1 sous la forme  $\frac{1}{p} + \frac{1}{q} + \frac{1}{n}$ , avec  $1 < p < q < n$  et  $p$  et  $q$  divisant  $n$  ?*

Il faut évidemment avoir  $\frac{3}{p} > 1$ , ce qui impose  $p = 2$  et donc aussi  $\frac{1}{q} + \frac{1}{n} = \frac{1}{2}$  ; il

nous faut donc  $\frac{2}{q} > \frac{1}{2}$  soit  $q < 4$ . On a donc  $q = 3$ , d'où  $n = 6$ , soit  $\frac{1}{2} + \frac{1}{3} + \frac{1}{6} = 1$ , ce qui manifestement convient.

**Autre interprétation** : 6 est le seul entier qui soit somme de 1 et de deux autres de ses diviseurs.

En revenant aux bédouins, on voit qu'un héritage de 5 chameaux peut être partagé comme suit : la moitié au fils aîné et le tiers au cadet, par le même artifice d'adjonction et retrait d'un chameau.

**Remarque** : Si  $n$  est le produit de deux nombres premiers  $p$  et  $q$ , avec  $n \neq 6$ ,  $n$  n'a que trois diviseurs stricts (deux si  $p = q$ ) : 1,  $p$  et  $q$ . D'après ce qui précède, il n'existe donc pas d'écriture ( $E_n$ ).

### 5. Écriture ( $E_n$ ) à quatre fractions

*Peut-on écrire 1 sous la forme  $\frac{1}{p} + \frac{1}{q} + \frac{1}{r} + \frac{1}{n}$ , avec  $1 < p < q < r < n$  et  $p, q$  et  $r$  divisant  $n$  ?*

Il faut cette fois avoir  $\frac{4}{p} > 1$ , ce qui impose  $p = 2$  ou  $p = 3$ .

**Supposons  $p = 3$**  ; on ne peut avoir  $n = 6$ , car cela imposerait  $q = 4$  et  $r = 5$ , alors que ces nombres divisent  $n$ . Donc, puisque  $p$  divise  $n$ , on a  $n \geq 9$ , donc  $\frac{1}{p} + \frac{1}{n} \leq \frac{4}{9}$ , ce qui entraîne  $\frac{1}{q} + \frac{1}{r} \geq \frac{5}{9} > \frac{1}{2}$  alors que  $\frac{1}{q} + \frac{1}{r} \leq \frac{1}{4} + \frac{1}{5} < \frac{1}{2}$ , d'où contradiction.

**On ne peut donc avoir que  $p = 2$** , d'où  $\frac{1}{q} + \frac{1}{r} + \frac{1}{n} = \frac{1}{2}$ . Il en résulte  $\frac{3}{q} > \frac{1}{2}$ , soit  $q < 6$ . Les seules possibilités *a priori* sont donc  $q = 3$ ,  $q = 4$  et  $q = 5$ .

**Supposons  $q = 3$**  ; il vient  $\frac{1}{r} + \frac{1}{n} = 1 - \frac{1}{2} - \frac{1}{3} = \frac{1}{6}$ . Posons  $n = rx$  (avec  $x > 1$ ). La relation  $\frac{1}{r} + \frac{1}{rx} = \frac{1}{6}$  s'écrit  $(r-6)x = 6$  ;  $x$  divise 6, donc vaut 2, 3 ou 6, ce qui donne respectivement pour  $r$  les valeurs 9, 8 et 7 et pour  $n$  les valeurs 18, 24 et 42 :

$$\frac{1}{2} + \frac{1}{3} + \frac{1}{9} + \frac{1}{18} = 1 \quad \frac{1}{2} + \frac{1}{3} + \frac{1}{8} + \frac{1}{24} = 1 \quad \frac{1}{2} + \frac{1}{3} + \frac{1}{7} + \frac{1}{42} = 1.$$

**Supposons  $q = 4$**  ; il vient  $\frac{1}{r} + \frac{1}{n} = \frac{1}{4}$ . Posons  $n = rx$  (avec  $x > 1$ ) ; la relation  $\frac{1}{r} + \frac{1}{rx} = \frac{1}{4}$  donne  $(r-4)x = 4$  ; donc  $(x=2, r=6)$  ou  $(x=4, r=5)$ . On arrive aux deux solutions :

$$\frac{1}{2} + \frac{1}{4} + \frac{1}{6} + \frac{1}{12} = 1 \quad \frac{1}{2} + \frac{1}{4} + \frac{1}{5} + \frac{1}{20} = 1.$$

**Supposons  $q = 5$**  ; il vient  $\frac{1}{r} + \frac{1}{n} = 1 - \frac{1}{2} - \frac{1}{5} = \frac{3}{10}$ . Posons encore  $n = rx$  (avec  $x > 1$ ). La relation  $\frac{1}{r} + \frac{1}{rx} = \frac{3}{10}$  donne  $(3r-10)x = 10$  ;  $(x=2, r=5)$  est exclu, car donnant  $q=r$  ;  $(x=5, r=4)$  est exclu, car donnant  $q > r$  ;  $x=10$  est exclu, car donnant  $3r=11$ .

Les cinq solutions trouvées plus haut sont donc les seules.

**Autre interprétation** : les seuls entiers qui soient somme de 1 et de trois autres de leurs diviseurs sont 12, 18, 20, 24, 42.

## 6. Allonger d'un cran une écriture ( $E_n$ )

◆ **Un exemple** : Partons de  $\frac{1}{2} + \frac{1}{4} + \frac{1}{5} + \frac{1}{20} = 1$ . Divisons par 2 ; on obtient  $\frac{1}{4} + \frac{1}{8} + \frac{1}{10} + \frac{1}{40} = \frac{1}{2}$  donc aussi  $\frac{1}{2} + \frac{1}{4} + \frac{1}{8} + \frac{1}{10} + \frac{1}{40} = 1$ , qui est manifestement une écriture ( $E_{40}$ ).

◆ **Généralisation** : Partant d'une écriture ( $E_n$ ),  $\frac{1}{p_1} + \frac{1}{p_2} + \dots + \frac{1}{p_k} + \frac{1}{n} = 1$ , avec  $p_1 < p_2 < \dots < p_k < n$  et les  $p_i$  divisant tous  $n$ , on divise par 2 et on ajoute  $1/2$ . Il vient  $\frac{1}{2} + \frac{1}{2p_1} + \frac{1}{2p_2} + \dots + \frac{1}{2p_k} + \frac{1}{2n} = 1$  et les dénominateurs divisent tous le dernier d'entre eux,  $2n$ . On a donc bien une écriture ( $E_{2n}$ ), dont tous les dénominateurs sont pairs.

## 7. Une autre façon d'allonger d'un cran une écriture ( $E_n$ )

◆ **L'idée** : on pourra trouver une écriture ( $E$ ) plus longue si on arrive à trouver  $q$  et  $r$  strictement supérieurs à  $n$  tels que  $\frac{1}{n} = \frac{1}{q} + \frac{1}{r}$  avec  $n$  et  $q$  divisant strictement  $r$ .

On est conduit à résoudre un problème indépendant de ce qui précède :  
*Étant donné un entier naturel  $n$  ( $n > 1$ ), trouver deux entiers  $q$  et  $r$  strictement supérieurs à  $n$  tels que  $\frac{1}{n} = \frac{1}{q} + \frac{1}{r}$  avec  $n < q$ ,  $n$  et  $q$  divisant strictement  $r$ .*

◆ **une solution simple** : En divisant  $n + 1$  par  $n(n + 1)$  de deux façons différentes (en bloc et séparément), on obtient  $\frac{1}{n} = \frac{1}{n+1} + \frac{1}{n(n+1)}$ , ce qui résout immédiatement notre problème.

◆ **d'autres solutions** : Si  $n$  n'est pas premier, posons  $n = xz$ , avec  $x \neq 1$  et  $z \neq 1$ . Il suffit de diviser par  $z$  l'égalité  $\frac{1}{x} = \frac{1}{x+1} + \frac{1}{x(x+1)}$  pour obtenir  $\frac{1}{xz} = \frac{1}{z(x+1)} + \frac{1}{n(x+1)}$ , qui répond manifestement à la question.

**Exemple** : Partant de  $12 = 12 \times 1 = 6 \times 2 = 4 \times 3 = 3 \times 4 = 2 \times 6 = 1 \times 12$ , on trouve

$$\frac{1}{12} = \frac{1}{13} + \frac{1}{156} = \frac{1}{14} + \frac{1}{84} = \frac{1}{15} + \frac{1}{60} = \frac{1}{16} + \frac{1}{48} = \frac{1}{18} + \frac{1}{36}.$$

La formule  $\frac{1}{2} + \frac{1}{4} + \frac{1}{6} + \frac{1}{12} = 1$  peut ainsi, de cinq façons différentes, être allongée

d'un cran.

**Remarque** : Observons que le dernier dénominateur  $r$  obtenu par un tel allongement est forcément pair, car dans l'expression  $r = xz(x+1)$  l'un des facteurs  $x$  ou  $x+1$  est forcément pair.

## 8. Composer deux écritures ( $E_n$ )

Le procédé est proche de celui utilisé au § 6, qui revenait à remplacer dans

$$1 = \frac{1}{2} + \frac{1}{2} \text{ le } 1 \text{ du second numérateur par une écriture } (E_n).$$

**Commençons par un exemple** : partant des deux écritures  $1 = \frac{1}{2} + \frac{1}{3} + \frac{1}{6}$  et

$$\frac{1}{2} + \frac{1}{4} + \frac{1}{5} + \frac{1}{20} = 1, \text{ on trouve aussitôt}$$

$$1 = \frac{1}{2} + \frac{1}{3} + \frac{1}{6} = \frac{1}{2} + \frac{1}{3} + \frac{1}{6} \left( \frac{1}{2} + \frac{1}{4} + \frac{1}{5} + \frac{1}{20} \right) = \frac{1}{2} + \frac{1}{3} + \frac{1}{12} + \frac{1}{24} + \frac{1}{30} + \frac{1}{120},$$

mais aussi

$$1 = \frac{1}{2} + \frac{1}{4} + \frac{1}{5} + \frac{1}{20} \left( \frac{1}{2} + \frac{1}{3} + \frac{1}{6} \right) = \frac{1}{2} + \frac{1}{4} + \frac{1}{5} + \frac{1}{40} + \frac{1}{60} + \frac{1}{120},$$

soit deux écritures (E) de plus grand dénominateur  $6 \times 20 = 120$ .

**Plus généralement** : considérons les deux écritures suivantes :

$$(E_n) \frac{1}{p_1} + \frac{1}{p_2} + \dots + \frac{1}{p_k} + \frac{1}{n} = 1, \text{ avec } p_1 < p_2 < \dots < p_k < n \text{ et les } p_i \text{ divisant tous } n,$$

et d'autre part :

$$(E_m) \frac{1}{q_1} + \frac{1}{q_2} + \dots + \frac{1}{q_h} + \frac{1}{m} = 1, \text{ avec } q_1 < q_2 < \dots < q_h < m \text{ et les } q_j \text{ divisant}$$

tous  $m$ .

On en déduit une écriture ( $E_{nm}$ ) :

$$\frac{1}{p_1} + \frac{1}{p_2} + \dots + \frac{1}{p_k} + \frac{1}{nq_1} + \frac{1}{nq_2} + \dots + \frac{1}{nq_h} + \frac{1}{nm} = 1$$

avec en outre  $p_1 < p_2 < \dots < p_k < nq_1 < nq_2 < \dots < nq_h < nm$ , les  $p_i$  et les  $nq_j$  divisant tous  $nm$ .

## 9. Une interrogation légitime

◆ Nous avons rencontré un certain nombre d'écritures ( $E_n$ ). Ces écritures et celles qu'on peut en déduire par allongement d'un cran et par composition commencent

toutes par  $\frac{1}{2}$ .

Ce qui amène à se poser une question : *toute écriture*  $(E_n)$  *commence-t-elle par*  $\frac{1}{2}$  ?

♦ La réponse est *non*. On a en effet l'égalité  $\frac{1}{3} + \frac{1}{4} + \frac{1}{6} + \frac{1}{8} + \frac{1}{9} + \frac{1}{72} = 1$ .

On peut remarquer qu'il existe au moins trois écritures  $(E_{72})$ , celle-ci et les deux que l'on obtient en combinant les écritures  $(E_6)$  et  $(E_{12})$  déjà rencontrées,  $\frac{1}{2} + \frac{1}{3} + \frac{1}{6} = 1$

et  $\frac{1}{2} + \frac{1}{4} + \frac{1}{6} + \frac{1}{12} = 1$ , ce qui donne  $\frac{1}{2} + \frac{1}{3} + \frac{1}{12} + \frac{1}{24} + \frac{1}{36} + \frac{1}{72} = 1$  et  $\frac{1}{2} + \frac{1}{4} + \frac{1}{6} + \frac{1}{24} + \frac{1}{36} + \frac{1}{72} = 1$ .

## 10. Autre interrogation légitime

**On appellera D l'ensemble des entiers  $n$  pour lesquels existe au moins une écriture  $(E_n)$ .**

♦ Les écritures  $(E_n)$  déjà rencontrées et celles qu'on peut en déduire par allongement d'un cran et par composition ont toutes un dénominateur final pair. D'où la question : *D ne contient-il que des nombres pairs ?*

♦ La réponse est encore non. Mais il faut aller chercher assez loin pour trouver un contre-exemple : le plus petit qu'on puisse trouver est 945.

Montrons qu'il est bien dans D. De  $945 = 3^3 \times 5 \times 7$  on tire la liste des diviseurs stricts :

$$1, 3, 5, 7, 9, 15, 21, 27, 35, 45, 63, 105, 135, 189, 315$$

Leur somme est 975 ; en retirant de la liste 9 et 21 on trouve bien 945 :

$$945 = 315 + 189 + 135 + 105 + 63 + 45 + 35 + 27 + 15 + 7 + 5 + 3 + 1$$

Et en divisant par 945 :

$$1 = \frac{1}{3} + \frac{1}{5} + \frac{1}{7} + \frac{1}{9} + \frac{1}{15} + \frac{1}{21} + \frac{1}{27} + \frac{1}{35} + \frac{1}{63} + \frac{1}{135} + \frac{1}{189} + \frac{1}{315} + \frac{1}{945},$$

ce qui permet ... de résoudre le problème du bédouin qui veut partager inégalement ses 944 chameaux entre ses 12 fils.

**Remarque 1 :** Au lieu de retirer de la liste des diviseurs 9 et 21, on peut en retirer 3 et 27, d'où

$$1 = \frac{1}{3} + \frac{1}{5} + \frac{1}{7} + \frac{1}{9} + \frac{1}{15} + \frac{1}{21} + \frac{1}{27} + \frac{1}{45} + \frac{1}{63} + \frac{1}{105} + \frac{1}{135} + \frac{1}{189} + \frac{1}{945}.$$

**Remarque 2 :** On a vu plus haut (§ 8) que D est stable par multiplication. D contient donc une infinité de nombres impairs, car il contient au moins toutes les puissances de 945. Signalons que le plus petit élément de D au-delà de 945 est 1575.

## Annexe : 945 est le plus petit élément impair de D

### A1. Nombres déficients

Un entier  $n$  strictement positif étant donné, notons  $s(n)$  la somme de ses diviseurs stricts. Depuis l'Antiquité grecque, on dit que  $n$  est :

**abondant** si  $s(n) > n$ , **parfait** si  $s(n) = n$ , **déficient** si  $s(n) < n$ .

Les éléments de D sont évidemment tous parfaits ou abondants. Pour montrer qu'il n'y a pas d'élément impair de D inférieur à 945, il suffira d'établir que tout impair  $n$  inférieur à 945 est déficient.

Si on considère  $S(n) = s(n) + n$ , somme de tous les diviseurs de  $n$ , y compris  $n$  lui-même, on aura donc à démontrer que, pour tout impair  $n$  inférieur à 945,  $S(n) < 2n$ ,

c'est-à-dire encore  $\frac{S(n)}{n} < 2$ .

### A2. Calcul de $S(n)$

a) Si  $n = p^k$ , où  $p$  est premier,  $S(n) = 1 + p + p^2 + \dots + p^k$  et  $\frac{S(n)}{n} = 1 + \frac{1}{p} + \dots + \frac{1}{p^k}$ .

b) Si  $n = p^k q^h$  où  $p$  et  $q$  sont deux nombres premiers distincts, les diviseurs de  $n$  sont les  $p^u q^v$  tels que  $0 \leq u \leq k, 0 \leq v \leq h$ . Leur somme est donc

$$S(n) = (1 + p + \dots + p^k)(1 + q + \dots + q^h)$$

et

$$\frac{S(n)}{n} = \left(1 + \frac{1}{p} + \dots + \frac{1}{p^k}\right) \left(1 + \frac{1}{q} + \dots + \frac{1}{q^h}\right).$$

c) Si  $n = p^k q^h r^l$  où  $p, q$  et  $r$  sont trois nombres premiers distincts, les diviseurs de  $n$  sont les  $p^u q^v r^w$  tels que  $0 \leq u \leq k, 0 \leq v \leq h, 0 \leq w \leq l$ . Leur somme est donc

$$S(n) = (1 + p + \dots + p^k)(1 + q + \dots + q^h)(1 + r + \dots + r^l)$$

et

$$\frac{S(n)}{n} = \left(1 + \frac{1}{p} + \dots + \frac{1}{p^k}\right) \left(1 + \frac{1}{q} + \dots + \frac{1}{q^h}\right) \left(1 + \frac{1}{r} + \dots + \frac{1}{r^l}\right).$$

La formule est évidemment généralisable à un nombre quelconque de facteurs premiers distincts.

### A3. Première majoration de $\frac{S(n)}{n}$ et première liste de nombres déficients

Nous utiliserons l'inégalité  $1 + x + \dots + x^m < \frac{1}{1-x}$ , valable pour  $0 < x < 1$  et  $m \geq 0$ , que l'on peut justifier sans douleur en multipliant les deux membres par  $1-x$ .

◆ Si  $n = p^k$  ( $p$  premier,  $k > 0$ ), de  $\frac{S(n)}{n} = 1 + \frac{1}{p} + \dots + \frac{1}{p^k}$ ,

on déduit  $\frac{S(n)}{n} \leq 1 + \frac{1}{2} + \dots + \frac{1}{2^k}$ , donc  $\frac{S(n)}{n} < \frac{1}{1-1/2}$ , autrement dit  $\frac{S(n)}{n} < 2$  ;  $n$  est donc déficient.

◆ Si  $n = p^k q^h$  où  $p$  et  $q$  sont deux nombres premiers impairs distincts ( $p < q$ ,  $k > 0$ ,  $h > 0$ ), on a

$$\frac{S(n)}{n} = \left(1 + \frac{1}{p} + \dots + \frac{1}{p^k}\right) \left(1 + \frac{1}{q} + \dots + \frac{1}{q^h}\right),$$

d'où  $\frac{S(n)}{n} \leq \left(1 + \frac{1}{3} + \dots + \frac{1}{3^k}\right) \left(1 + \frac{1}{5} + \dots + \frac{1}{5^h}\right)$  et  $\frac{S(n)}{n} < \frac{1}{1-1/3} \times \frac{1}{1-1/5}$ , soit

$$\frac{S(n)}{n} < \frac{15}{8} < 2 ; n \text{ est donc déficient.}$$

◆ Si  $n = p^k q^h r^l$  où  $p$ ,  $q$  et  $r$  sont trois nombres premiers impairs distincts ( $p < q < r$ ), il faut jouer plus fin, car l'application brutale de la méthode précédente donne

$$\frac{S(n)}{n} < \frac{1}{1-1/3} \times \frac{1}{1-1/5} \times \frac{1}{1-1/7}, \text{ soit } \frac{S(n)}{n} < \frac{105}{48}, \text{ majorant supérieur à } 2.$$

### A4. Liste complémentaire de nombres déficients

◆ Reprenons le cas  $n = p^k q^h r^l$  où  $p$ ,  $q$  et  $r$  sont trois nombres premiers impairs distincts, en supposant cette fois  $3 < p < q < r$ .

$$\text{On a } \frac{S(n)}{n} < \frac{1}{1-1/5} \times \frac{1}{1-1/7} \times \frac{1}{1-1/11}, \text{ soit } \frac{S(n)}{n} < \frac{5 \times 7 \times 11}{4 \times 6 \times 10} ;$$

$$\text{donc } \frac{S(n)}{n} < \frac{385}{240} < 2 ; n \text{ est déficient.}$$

◆ Supposons maintenant  $n = 3^k q^h r^l$  où  $q$  et  $r$  sont premiers impairs, avec  $5 < q < r$ .

$$\text{On a } \frac{S(n)}{n} < \frac{1}{1-1/3} \times \frac{1}{1-1/7} \times \frac{1}{1-1/11}, \text{ soit } \frac{S(n)}{n} < \frac{231}{120} < 2 ; n \text{ est déficient.}$$



◆ Supposons  $n = 3 \times 5^h \times r^l$ , avec  $r > 5$ .

$$\frac{S(n)}{n} < \left(1 + \frac{1}{3}\right) \times \frac{1}{1-1/5} \times \frac{1}{1-1/7}, \text{ soit } \frac{S(n)}{n} < \frac{4 \times 5 \times 7}{3 \times 4 \times 6}; \text{ donc } \frac{S(n)}{n} < \frac{35}{18} < 2;$$

$n$  est déficient.

### A5. Impairs non déficients inférieurs à 1000

Nous savons qu'il en existe au moins un, à savoir 945. Supposons qu'il en existe un autre,  $n$ .

◆ Il ne peut avoir plus de trois diviseurs premiers distincts, car il vaudrait au moins  $3 \times 5 \times 7 \times 11$ , soit 1155. On a en outre vu au § A3 que  $n$  ne peut être ni une puissance d'un nombre premier, ni le produit de deux telles puissances. **Il a donc exactement trois diviseurs premiers distincts.**

◆ En outre, si on écrit  $n$  sous la forme  $n = p^k q^h r^l$  où  $p, q$  et  $r$  sont trois nombres premiers impairs distincts ( $p < q < r$ ), on a vu au § A4 que  $p = 3, q = 5, k \geq 2$ .

◆ On part donc de  $n = 3^k 5^h r^l$ , avec  $k \geq 2, h \geq 1, l \geq 1$ ;  $n$  est donc divisible par  $9 \times 5 = 45$ . Si on avait  $l \geq 2$ , on aurait l'inégalité  $n \geq 9 \times 5 \times 49$ , donc  $n > 1000$ , ce que nous avons exclu.

◆ On a donc  $n = 3^k 5^h r$ . **Supposons d'abord  $r \geq 11$ .** On a  $3^k 5^h \leq \frac{999}{11}$ , donc  $3^k 5^h < 91$

et, comme  $3^k 5^h$  est un multiple impair de 45,  $3^k 5^h = 45$ . Ainsi  $n = 3^2 \times 5r$ .

$$\frac{S(n)}{n} = \left(1 + \frac{1}{3} + \frac{1}{9}\right) \left(1 + \frac{1}{5}\right) \left(1 + \frac{1}{r}\right) \leq \left(1 + \frac{1}{3} + \frac{1}{9}\right) \left(1 + \frac{1}{5}\right) \times \left(1 + \frac{1}{11}\right)$$

$$\text{donc } \frac{S(n)}{n} \leq \frac{13 \times 6 \times 12}{9 \times 5 \times 11} = \frac{936}{495} < 2.$$

Le nombre est donc déficient.

◆ Restent à examiner les nombres  $n = 3^k \times 5^h \times 7$ , avec  $k \geq 2, h \geq 1$ . Ils sont multiples de  $3^2 \times 5 \times 7$ , soit 315; les seules possibilités sont 945, bien connu de nous, et 315 lui-même.

Montrons que 315 est déficient :

$$\frac{S(315)}{315} = \left(1 + \frac{1}{3} + \frac{1}{9}\right) \left(1 + \frac{1}{5}\right) \left(1 + \frac{1}{7}\right) = \frac{13 \times 6 \times 8}{9 \times 5 \times 7} = \frac{624}{315} \approx 1,98.$$

**Conclusion :** 945 est le seul élément impair non déficient de  $]0, 1000[$ ; c'est aussi le seul élément impair de  $D$  situé dans cet intervalle.

### Références

◆ « Des chameaux sans conflits ni confits », Bulletin de l'APMEP n° 472. p. 648-656.

◆ Sur les fractions égyptiennes, « Calculer comme les Égyptiens », Bulletin de l'APMEP n° 503, p. 143-154.