La calculette (suite)

Jacques VERDIER

Pour calculer $\tan x$, $\cos x$ ou $\sin x$, comme pour calculer $\log x$ ou $\ln x$, la calculette n'utilise pas les développements limités (leur convergence est beaucoup trop lente et ils sont très « coûteux » en opérations binaires).

La machine ramène le calcul de $\sin x$ et de $\cos x$ à celui de $\tan x$ par

$$\cos x = \frac{1}{\sqrt{1 + \tan^2 x}} \text{ et } \sin x = \sqrt{1 - \cos^2 x} \text{ pour tout } x \in \left[0 ; \frac{\pi}{2} \right] \text{ (radians).}$$

La machine a en mémoire morte π et $180/\pi$, ce qui permet de convertir les angles en radians et de ramener les calculs au premier quadrant.

Algorithme de calcul de $\tan x$

Le processus consiste à soustraire à x un certain nombre de constantes a_i codées en ROM (mémoire morte) jusqu'à ce que la différence soit « presque » nulle. Ces constantes sont appelées ATR (Arc Tangent Radix) et valent :

$$\begin{aligned} a_0 &= \text{Arctan } 10^0 = \pi/4 = 7,853\,981\,633\,974 \cdot 10^{-1} \\ a_1 &= \text{Arctan } 10^{-1} = 9,966\,865\,249\,116 \cdot 10^{-2} \\ a_2 &= \text{Arctan } 10^{-2} = 9,999\,666\,686\,665 \cdot 10^{-3} \\ a_3 &= \text{Arctan } 10^{-3} = 9,999\,996\,666\,669 \cdot 10^{-4} \\ a_4 &= \text{Arctan } 10^{-4} = 9,999\,999\,966\,667 \cdot 10^{-5} \end{aligned}$$

(une TI58 possède en mémoire $a_0, a_1, \dots, a_4$ codés en DCB chacun sur 8 octets).

Prenons par exemple $x = 1,5$ (radians)

On enlève une fois $\pi/4$, 7 fois $\text{Arctan}(1/10)$, 1 fois $\text{Arctan}(1/100)$, 6 fois $\text{Arctan}(1/1000)$ et 9 fois $\text{Arctan}(1/100000)$.

On trouve alors, avec l'algorithme, $Y/X \approx 14,101358$.

(voir schéma page suivante).

Comme pour le calcul de $\ln x$, il y a une estimation de l'erreur sur ce résultat, et la machine affiche $\tan 1,5 = 14,401\,419$.

Démonstration de cet algorithme dans :

J. E. VOLDER, *The C.O.R.D.I.C. trigonometric computing technique*, 1959, IEEE Transactions on Electronic Computers, vol. 8, pp. 330-334. (consultable à Paris au CNRS et au CNET).

Le point de départ est $(X, Y) = (1, 0)$. On passe d'un point au suivant par

$$\begin{cases} X \leftarrow X - \frac{1}{10^i} Y \\ Y \leftarrow Y + \frac{1}{10^i} X \end{cases}$$

Il est facile de montrer que l'angle duquel on a « tourné » est $\text{Arctan}(10^{-i})$, car :

$$\tan(u - v) = \frac{\tan u - \tan v}{1 - \tan u \tan v} \text{ avec } \tan u = \frac{Y}{X} \text{ et } \tan v = \frac{Y + \frac{X}{10^i}}{X - \frac{Y}{10^i}}.$$