Vous pouvez envoyer vos contributions à l'adresse électronique suivante : deligt@wanadoo.fr

Des problèmes

67-1 de Serge Parpay (Niort) :

Les droites d_1, d_2, d_3 et d_4 sont concourantes au point O. Construire une droite d qui coupe ces quatre droites respectivement en A_1, A_2, A_3 et A_4 de telle façon que $A_1A_2 = A_3A_4$.

67-2 de Frédéric de Ligt (Montguyon) :

On a l'identité $(n + 2)n + 1 = (n + 1)^2$; cela suggère l'idée de s'intéresser aux suites (a_n) qui vérifient $a_{n+2}a_n + 1 = a_{n+1}^2$. En particulier, pourriez-vous montrer, qu'à partir de $a_1 = 1$ et de $a_2 = m$ avec m entier supérieur à 1, la suite (a_n) ne produit que des entiers naturels ?

67-3 extrait du livre « Le fabuleux destin de $\sqrt{2}$ » par Benoît Rittaud (éditions Le Pommier, 2006, p.293) :

Soit ABCD un rectangle initial quelconque. Amenons par pliage le côté [AB] sur le côté [BC], puis déplions : le segment qui marque le pli est noté [BM]. Plions ensuite le côté [BC] sur le segment [BM], ce qui amène le point C en un point noté N, puis déplions à nouveau. La parallèle au côté [AD] passant par N (qui se construit elle aussi par pliage) coupe les côtés [AB] et [CD] respectivement en A' et D' , et le rectangle $A'BCD'$ est un rectangle dont le rapport longueur / largeur est de $\sqrt{2}$.

A prouver !

Un livre très riche que je conseille vivement à tous les collègues. Vous pensiez tout connaître de ce nombre familier, « Le fabuleux destin de $\sqrt{2}$ » vous fera changer d'avis.

Des solutions

67-4 (cité par Dominique Roux dans sa conférence à l'IREM le 3 juin 2005) :

Soit ABC un triangle tel que $AB = AC$ et $\widehat{BAC} = 20^\circ$. On construit D sur [AC] tel que $\widehat{CBD} = 60^\circ$, et E sur [AB] tel que $\widehat{BCE} = 50^\circ$. Calculer l'angle $\widehat{BDE}$.

Solution de Frédéric de Ligt :

Le triangle ABC étant isocèle en A, il est clair que $\widehat{EBD} = 20^\circ$ et que $\widehat{ECD} = 30^\circ$. Ce triangle ABC représente une des dix huit portions d'un polygone régulier à 18 côtés dont le centre est A. Nommons ce polygone $A_1 \dots A_{18}$ en convenant que $A_1 = C$ et $A_2 = B$. Il s'agit de montrer en premier lieu que la corde $[A_3A_{15}]$ coupe ce triangle aux points E et D.

Les cordes $[A_3A_{15}]$ et $[A_1A_7]$ sont symétriques par rapport à (AA_2) et se coupent donc sur $[AA_2]$. Comme $\widehat{AA_1A_7} = 120^\circ$, $\widehat{AA_1A_7} = 30^\circ$ et donc les cordes $[A_3A_{15}]$ et $[A_1A_7]$ se coupent bien au point E. Les triangles $AA_{15}A_{18}$ et AA_3A_{18} sont tous deux équilatéraux, $AA_{15}A_{18}A_3$ est donc un losange. La diagonale $[A_3A_{15}]$ est sur la médiatrice de la diagonale $[AA_{18}]$; par conséquent, si on note provisoirement M le point d'intersection de $[A_{15}A_3]$ et de $[AA_1]$, $MA = MA_{18}$. Comme par ailleurs $MA_{18} = MA_2$, on en déduit que $MA = MA_2$. Le triangle AMA_2 est donc isocèle en M, et $\widehat{MAA_2} = \widehat{MA_2A} = 20^\circ$. D'après l'énoncé, le point M se confond donc avec le point D.

La corde $[A_3A_{15}]$ est bissectrice de l'angle $\widehat{ADA_{18}}$, par conséquent $\widehat{ADA_{15}} = 70^\circ$, on en déduit son angle opposé $\widehat{EDA_1} = 70^\circ$. L'angle $\widehat{ADA_2}$ valant 140° , son supplémentaire $\widehat{A_2DA_1}$ vaut donc 40° .

On trouve finalement $\widehat{A_2DE} = 70^\circ - 40^\circ = 30^\circ$.

63-1. Un prolongement de l'exercice 56-4 proposé par Jacques Chayé :

Un point A est fixé à l'intérieur d'un cercle. Deux droites perpendiculaires pivotent autour de A ; la première coupe le cercle en M et M', la seconde en N et N'. La tangente en M et la tangente en M' se coupent en T₁. La tangente en N et la tangente en N' se coupent en T₂. La tangente en M et la tangente en N se coupent en U₁. La tangente en M' et la tangente en N' se coupent en U₂. La tangente en M et la tangente en N' se coupent en U₃. La tangente en M' et la tangente en N se coupent en U₄. Quels sont les ensembles de points décrits par les points T₁, T₂, U₁, U₂, U₃, U₄ ?

Solution de l'auteur :

Ensemble décrit par T₁ et T₂ : c'est, bien sûr, la polaire de A par rapport au cercle (figure 1).

Ensemble décrit par U₁ : Soit I le milieu de [MN] ; on a vu à l'exercice 56-4 que, r étant le rayon du cercle initial, I décrit un cercle de centre P et de rayon $(r^2 - 2AP^2) / 2$.

Or, dans le triangle OMU₁ rectangle en M : $OI \times OU_1 = OM^2 = r^2$. On passe donc de I à U₁ par l'inversion de centre O et de puissance r². On en déduit que U₁ décrit l'image du cercle décrit par I. Pour les mêmes raisons, U₂, U₃ et U₄ décrivent eux aussi ce cercle (figure 2)

Figure 1

figure 2

65-3 (Jean-Christophe Laugier) :

Déterminer des entiers A et B tels que $A/B = 0,2006\dots$ avec B minimal.

Solution de Serge Parpay :

Première solution :

Notation : $[\alpha]$ est la partie entière du nombre positif α .

La fraction A/B doit vérifier la double inégalité $0,2006 < A/B < 0,2007$ et B doit être minimal. Soit une fraction a/b vérifiant

$$2006/10000 < a/b < 2007/10000 \quad (1). \quad b < \frac{10000}{2006} a < 5a : \text{On peut poser } b = 5a - p \text{ avec } p \text{ entier et } 0 < p < 5a.$$

$$(1) \text{ prend alors la forme } \frac{2006}{10000} < \frac{a}{5a-p} < \frac{2007}{10000}. \text{ On en déduit la double inégalité : } \frac{2007}{35} p < a < \frac{2006}{30} p.$$

$$\text{Comme } a \text{ est un entier : } \left[\frac{2007}{35} p \right] + 1 \leq a \leq \left[\frac{2006}{30} p \right].$$

$$\text{Si } p = 1, 58 \leq a \leq 66 \text{ et donc } 289 \leq 5a - 1 \leq 329, \text{ si } p \geq 2, a > \frac{2007}{35} p \geq \frac{4014}{35} > 114 \text{ et } 5a - p > 10000 \times 114 / 2007 > 568.$$

La plus petite valeur de $5a - p$ est égale à 289 avec $a = 58$ et $p = 1$.

Les valeurs cherchées sont par conséquent $A = 58, B = 289$, avec $58/289 = 0,2006920\dots$

Deuxième solution :

Notation : Soit une fraction α / β telle que $\alpha < \beta$. Cette fraction admet un développement en fraction continue. On adoptera la notation $\alpha / \beta = (\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_{n-1}, \alpha_n)$. Par exemple $57 / 284 = 1 / (4 + 1 / (1 + 1 / 56))$ s'écrira $57 / 284 = (4, 1, 56)$.

La fraction A/B doit vérifier la double inégalité $0,2006 < A/B < 0,2007$ avec B minimal. Soit une fraction a/b vérifiant

$2006/10000 < a/b < 2007/10000$. On a $2006/10000 = (4, 1, 65, 1, 6, 2)$; les premières réduites sont : $(4, 1) = 1/5$ et $(4, 1, 65) = 66/329$. Par ailleurs $2007/10000 = (4, 1, 56, 1, 11)$; les premières réduites sont : $(4, 1) = 1/5$ et $(4, 1, 56) = 57/284$.

Par suite $1/5 < a/b < 57/284$, soit $57/285 < a/b < 57/284$.

Soit le repère (Ox, Oy) , une fraction α / β sera représentée par le point de coordonnées $(\beta ; \alpha)$.

Pour des raisons graphiques, les longueurs des graduations ne sont pas respectées. Le schéma n'est là que pour aider à la lecture du texte.

On utilise les points M et N représentant les fractions $57/285$ et $57/284$. M $(285 ; 57)$: le coefficient directeur de (OM) vaut $1/5$. N $(284 ; 57)$: le coefficient directeur de (ON) vaut $57/284$. La fraction A/B recherchée sera représentée par un point $\Psi(B ; A)$, situé nécessairement

dans l'angle MON . Il y a 57 points de coordonnées entières sur le segment $[OM]$. Il y a un point de coordonnées entières sur le segment $[MN]$, le point M. Il y a un point de coordonnées entières sur le segment $[NO]$, le point N. Donc sur le pourtour du triangle OMN , il y a 59 points de coordonnées entières.

L'aire du triangle étant égale à $57/2$, n étant le nombre de points de coordonnées entières intérieurs au triangle, on a $57/2 = 59/2 + n - 1$ (théorème de Pick).

Donc $n = 0$, par suite le point Ψ ne peut être situé dans le triangle OMN . Soit le point P $(290 ; 58)$ sur la droite (OM) et Q $(16472/57 ; 58)$ sur la droite (ON) : $288 < 16472/57 < 289 < 290$, le point K $(289 ; 58)$ est le point de coordonnées entières

d'abscisse minimum situé dans l'angle MON .

Comme on a de plus $0,2006 < 58/289 < 0,2007$; le point K est le point Ψ recherché. Les valeurs cherchées sont par conséquent $A = 58, B = 289$, avec $58/289 = 0,2006920\dots$

65-4 (de Jean-Christophe Laugier) :

Existe-t-il une fonction de $\mathbf{R}$ dans $\mathbf{R}$ non constante telle que $f(x + 1) = f(x)$ et $f(x + \sqrt{2}) = f(x)$?

Solution de Serge Parpay :

Soit E l'ensemble des nombres s'écrivant $a + b\sqrt{2}$ avec a et b entiers relatifs. Soit la fonction numérique de $\mathbf{R}$ dans $\mathbf{R}$ telle que, si $x \in E, f(x) = 1$ et si $x \notin E, f(x) = 0$. m et n étant des entiers, $f(x + n + m\sqrt{2}) = f(x)$. La fonction f répond à la question posée.