LEÇONS ÉLÉMENTAIRES DE MATHÉMATIQUES.

Par M. l'Abbé DE LA CAILLE, de l'Académie Royale des Sciences, de celles de Petersbourg, de Berlin, de Stockholm, de Gottingue, & de l'Institut de Bologne; Professeur de Mathématiques au Collège Mazarin.

NOUVELLE ÉDITION;

Avec de nouveaux Éléments d'Algebre, de Géométrie, de Trigonométrie rectiligne & sphérique, de Sections coniques, de plusieurs autres Courbes, de Calcul Différentiel & de Calcul Intégral.

Par M. l'Abbé MARIE, de la Maison & Société de Sorbonne, Sous-Précepteur de Monseigneur LE DUC D'ANGOULÊME, Professeur de Mathématiques au Collège Mazarin.

A P A R I S;
Chez la Veuve DESAINT, Libraire,
rue du Foin S. Jacques.

M. DCC. LXXVIII.

Avec Approbation & Privilège du Roi.

BONNES VIEILLES PAGES

En 1740 l'abbé de LA CAILLE est en Auvergne où il effectue avec CASSINI des travaux de géodésie nécessités par l'établissement de la carte de France . C'est alors que le Collège Mazarin, à Paris, lui demande de venir enseigner les mathématiques. Avec tout le sérieux que chacun lui reconnaît, La Caille s'attèle à cette tâche et rédige les " Leçons élémentaires de mathématiques" traduites en latin, espagnol, anglais et rééditées en français de nombreuses fois au cours du XVIIIème siècle.

Les "leçons" traitent de l'arithmétique, de l'algèbre, de la géométrie, de la trigonométrie, des sections coniques, du calcul différentiel, du calcul intégral, c'est à dire à peu près de l'ensemble des mathématiques enseignées à l'époque. On y relève explicitement le désir de présenter simplement les questions à étudier et d'en montrer les applications.

Nous proposons ici à la lecture, l'introduction du chapitre sur le calcul différentiel.

FIG.

ÉLÉMENTS DU CALCUL DIFFÉRENTIEL.

Il en est du Calcul Différentiel comme de l'Algebre : on ne sauroit le définir d'une maniere intelligible pour ceux qui n'en connoissent pas les premiers éléments.

Newton fut le premier Inventeur de ce calcul , & personne n'en eût partagé la gloire avec lui , s'il eût été plus empressé de mettre au jour ses découvertes.

Mais l'espece de mystere dont il les enveloppa dans l'origine , donna le temps à Leibnitz de marcher à grands pas dans la même carrière. Bientôt après Jacques & Jean Bernoulli coururent sur ses traces ; de-là cette vive contestation que les Géometres Allemands eurent avec les Géometres Anglois , pour savoir à qui de Leibnitz ou de Newton étoit due la principale gloire. Sans entrer dans cette discussion , nous observerons que d'autres Géometres avoient présumé depuis long-temps à la découverte du calcul Différentiel.

Il ne seroit même pas difficile de faire voir une espece de filiation entre ce calcul & la *Méthode d'Exhaustion* , si connue des Anciens , la *Méthode des Indivisibles* , donnée par Cavalieri , & les procédés dont Fermat , Descartes , Barrow & tant d'autres faisoient usage avant Newton. Les travaux de ces derniers Géometres semblent avoir servi d'échelons à ce grand homme.

775. Quoi qu'il en soit , supposons qu'une variable quelconque x reçoive un accroissement fini e ; de maniere qu'après l'avoir reçu , son état soit exprimé par $x + e$. On demande quels doivent être les accroissements correspondants des autres fonctions de x ?

D'abord il est clair que si x devient $x + e$, son carré x^2 deviendra $x^2 + 2ex + ee$; ainsi le rapport de ces deux accroissements sera $\frac{1}{2x + e}$. Mais si e diminue , ce rapport augmentera , & il appro-

chera de plus en plus de celui de $\frac{1}{2x}$. Cependant il ne lui deviendra égal , qu'au moment où e s'évanouira : le rapport de $\frac{1}{2x}$ est donc la *limite* de ceux que les accroissements finis de x & de xx peuvent avoir entre eux. On trouvera de même que la limite de ceux de x & de x^n est $\frac{1}{nx^{n-1}}$.

776. Or le calcul différentiel a pour objet de déterminer ces limites dans tous les cas. Voyez ce que M. d'Alembert a écrit sur cette matiere ; vous y trouverez les vraies notions de ce calcul. S'il reste encore quelques difficultés de Métaphysique , c'est qu'elles sont inséparables des idées toujours abstraites de limite & d'infini.

777. Voici une des applications les plus propres à faire entendre la manière de déterminer ces limites. Soit proposé de mener une tangente au point M de la courbe AMm , ou, ce qui revient au même, soit proposé de déterminer la soutangente PT . FIG. 184.

On supposera que l'abscisse $AP = x$ croît d'une quantité finie $Pp = e$; on mènera l'ordonnée $PM = y$, & on déterminera l'ordonnée mp , en substituant $x + e$ au lieu de x dans l'équation de la courbe. Quelle que soit la valeur de cette ordonnée, on pourra toujours la représenter par $y + Pe + Qe^2 + Re^3 + \&c.$ ($P, Q, R, \&c.$ étant des fonctions de x); on aura donc pour l'expression de rm , accroissement correspondant de l'ordonnée PM , la quantité $Pe + Qe^2 + Re^3 + \&c.$

Cela posé, soient menées la sécante SMm , & la ligne Mr parallèle & égale à Pp ; on aura $PS = \frac{y}{P + Qe + Re^2 + \&c.}$ Rapprochons maintenant le point p du point P ; le point m s'approchera du point M , & le point S du point T : mais on aura toujours $PS = \frac{y}{P + Qe + Re^2 + \&c.}$ Si la quantité Pp diminue encore & devient très-petite, il ne s'en faudra que de très-peu que m ne se confonde avec M , & que la sécante ne devienne tangente. Mais si e s'évanouit, le rapport déjà trouvé se réduit à $\frac{y}{P}$, PS devient PT , Sm devient TM qui n'a plus que le point M de commun avec la courbe, & la soutangente est déterminée par cette limite.

PAR EX. Si AMm est une parabole, on substituera $x + e$ à x dans l'équation $y = \sqrt{px}$, & on aura $y = p^{\frac{1}{2}}(x + e)^{\frac{1}{2}} = p^{\frac{1}{2}}x^{\frac{1}{2}} + \frac{1}{2} \cdot \frac{p^{\frac{1}{2}}}{x^{\frac{1}{2}}}e - \&c.$, qui donne $P = \frac{1}{2} \sqrt{\frac{p}{x}}$; d'où $PT = \frac{\sqrt{px}}{\frac{1}{2} \sqrt{\frac{p}{x}}} = 2x$, comme nous l'avons déjà trouvé (669).

On voit par là avec quelle promptitude cette méthode résout le problème des tangentes, qui est en quelque sorte le berceau du calcul différentiel. Mais on verra bien plus amplement dans la suite la conformité des résultats de ce calcul avec ceux de l'ancienne Géométrie.

En attendant, nous remarquerons que ces quantités Pp , ou Mr , & rm que nous avons supposées diminuer de plus en plus, à mesure que le point p se rapproche du point P , sont les éléments respectifs de l'abscisse AP & de l'ordonnée MP .

778. Ces éléments, quelque petits qu'on les suppose, conservent entre eux le même rapport que les quantités finies auxquelles ils appartiennent; cela est visible par la seule inspection des triangles

semblables TPM & Mmr . Et comme la limite de ce rapport n'a lieu qu'au moment où ces éléments s'évanouissent, on peut dire avec M. Euler, que le calcul différentiel a pour objet de faire connoître à quoi se réduisent les rapports des éléments des quantités variables, lorsque ces éléments deviennent nuls.

Mais ne pouvant devenir nuls, sans passer par tous les degrés possibles de diminution, on sent bien qu'il doit résulter de leur décroissement infini des idées un peu confuses : car notre esprit ne comporte pas de perception claire de ce qui tient à l'infini. Aussi depuis son origine, le calcul différentiel a-t-il éprouvé beaucoup de contradictions. Il en éprouvera sans doute encore ; mais s'il falloit répondre à toutes les chicanes d'une Métaphysique pointilleuse, on n'en finiroit pas. L'existence même du mouvement seroit encore un problème, si on s'étoit arrêté aux difficultés que Zénon proposoit autrefois pour la combattre.

Ce n'est pas au reste que Maclaurin, dans son *Traité des Fluxions*, n'ait répondu à la plupart des sophismes dont quelques Auteurs ont voulu embrouiller la matiere. C'est un Ouvrage qu'il faut lire, quand on veut approfondir cette théorie : mais on ne peut se dissimuler que pour suivre la marche rigoureuse de ce savant homme, il faut essuyer bien des longueurs.

779. Si les principes dont Leibnitz est parti, ne semblent pas aussi exacts, ils ont du moins l'avantage de conduire aux mêmes résultats que ceux de Newton, & de ne demander, pour ainsi dire, que deux suppositions : la première, qu'en diminuant de plus en plus les élémens des quantités variables, on peut les réduire à des *infiniment petits*. La seconde, qu'il existe entre les *infiniment petits* de deux ordres différens, la même subordination qui est entre les quantités finies & leurs éléments. Ces deux suppositions, une fois admises, les regles du calcul ne souffrent plus de difficulté.

Or telle est la subordination d'une quantité *infiniment petite* par rapport à la quantité finie dont on la considère comme l'élément, qu'elle peut être négligée sans erreur sensible, de même qu'on néglige une quantité finie par rapport à une quantité infinie. C'est ainsi, par exemple, que $\infty - 1$, & plus généralement $\infty \pm a$ se réduisent à ∞ . On peut donc regarder un *infiniment petit* du second ordre, comme une quantité qui s'évanouit par rapport à un *infiniment petit* du premier.

Cela posé, Leibnitz imagine qu'une variable x croisse ou décroisse d'une quantité *infiniment petite*, qu'il désigne par dx , & il cherche quels doivent être les accroissemens ou les décroissemens respectifs des autres fonctions de x . Son carré x^2 , par exemple, devenant $(x \pm dx)^2 = x^2 \pm 2x dx + dx dx$, il est clair que $dx dx$ doit être rejeté comme un *infiniment petit* du second ordre, & que par conséquent la différence entre x^2 & $x^2 \pm 2x dx$ est $\pm 2x dx$. Ainsi l'accroissement correspondant du carré d'une variable quelconque est le produit du double de cette variable multipliée par son accroissement.

780. En général, la différence qui régné entre une quantité variable avant qu'elle ait reçu aucune altération infiniment petite, & cette même quantité après qu'elle a reçu quelque altération de ce genre, s'appelle *la différentielle* de cette quantité; ce qui a fait donner le nom de calcul différentiel, à la méthode qui détermine dans tous les cas ces différences.

Newton lui avoit donné auparavant le nom de *Calcul des Fluxions*, par une suite de l'idée qu'il s'étoit faite de la formation de toutes les quantités. Imaginant en effet que tout ce qui croît ou diminue dans la nature, reçoit ces accroissements ou ces diminutions par le mouvement d'un de ses éléments, il appella calcul des fluxions, la méthode dont il se servoit pour déterminer les rapports de ces variations.

781. Il nomma *Fluents* les quantités que Leibnitz appelle *variables*, & ce que nous désignerons par dx , il le désigna par un point

mis sur x ; en sorte que dx & $\dot{x}$ signifient la même chose, & que fluxion de x , ou différentielle de x sont absolument synonymes. Le seul avantage qu'il y ait à se servir de la lettre d , au lieu d'un point, pour marquer les différentielles ou les fluxions des variables, c'est qu'elle les fait mieux reconnoître parmi d'autres quantités. Il eût même été à propos d'introduire dès le commencement quelque caractère propre à marquer les différentielles, comme on en a introduit un pour marquer les radicaux. Mais à présent que l'usage a prévalu, toute innovation de ce genre seroit déplacée, outre qu'elle auroit bien peu d'utilité.

782. Ainsi que les quantités finies & variables x & y ont des différentielles dx & dy , ces différentielles à leur tour en ont aussi. On les appelle *Différences secondes*, pour les distinguer des premières, & on les désigne indifféremment par ddx & ddy , ou par $\ddot{x}$ & $\ddot{y}$. Les différentielles troisièmes sont $dddx$ & $dddy$, ou $\ddot{\ddot{x}}$ & $\ddot{\ddot{y}}$, & ainsi de suite.

Pour abrégé, on écrit d^2x , d^3x au lieu de ddx , $dddx$. En général, la lettre d mise devant une quantité quelconque indique qu'il faut *différencier* cette quantité; & l'exposant de la même lettre d annonce combien de fois de suite il faut procéder à la *différenciation*.

Lorsque la quantité proposée est polynome, on la met entre deux parenthèses, que l'on fait précéder de la lettre d . Ainsi $d(x^2 + y^2)$ indique qu'il faut différencier le binome $x^2 + y^2$.

783. Quoique les différentielles de même degré soient toutes infiniment petites, il s'en faut bien qu'elles soient toujours égales. Et si on demande quel rapport peut se trouver entre dx & dy , dans la supposition que ces différentielles s'évanouissent, il est aisé de faire voir qu'il y en a un. En attendant que nous enseignions

432 LEÇONS ÉLÉMENTAIRES

FIG. la maniere d'en trouver l'expression, soit $\frac{aa - xx}{a - x}$; il est certain

que $a + x$ exprime la valeur de cette fraction, quelle que soit la valeur de x ; mais si $x = a$, la fraction se réduit à $\frac{0}{0}$, & le quotient devient $2a$. Voilà donc un exemple de ces sortes de fractions dont le numérateur & le dénominateur s'évanouissent en même temps, & qui cependant ont des valeurs très-réelles.

784. Si on suppose infini le diviseur d'une quantité finie quelconque a , il est clair que le quotient doit alors se réduire à zéro.

On a donc $\frac{a}{\infty} = 0$; ce qui donne $a = 0 \times \infty$; d'où il suit que

zéro multiplié par une quantité infinie peut représenter indifféremment toute sorte de quantités finies; & réciproquement, que toute quantité finie divisée par zéro a pour quotient l'infini, c'est-à-dire, que ∞ & 0 servent dans le calcul différentiel, comme autant de quantités indéterminées. Ce sont des expressions vagues, dont il semble que l'on ne s'est avisé que pour éviter des circonlocutions.

Pl. 10.