L'INÉGALITÉ D'ERDÖS-MORDELL

(Suite)

Patrick FUHR

4.— DEUXIÈME DÉMONSTRATION DE L'INÉGALITÉ (E.M.)

Cette démonstration s'appuiera sur une minoration des longueurs MA , MB et MC dont l'idée repose essentiellement sur des calculs d'aires : rappelons que l'aire d'un parallélogramme est égale au produit d'une quelconque de ses bases par la hauteur correspondante; il revient au même de dire que l'aire des parallélogrammes possède la propriété suivante :

“Si le segment $[CD]$ se déplace (de manière qu'on ait toujours : $\overrightarrow{AB} = \overrightarrow{DC}$) sur une droite d parallèle à (AB) , l'aire du parallélogramme $ABCD$ reste constante.”

Figure 5

$$\text{Aire } ABCD = \text{Aire } ABC'D'.$$

Ceci rappelé, commençons par préciser les notations que nous utiliserons, et qui apparaissent sur la figure 6 :

Figure 6

B' (resp. C') désigne le symétrique de B (resp. C) par rapport à la bissectrice intérieure de $\hat{A}$;

B'' et C'' sont définis par : $\overrightarrow{B'B''} = \overrightarrow{AM} = \overrightarrow{C'C''}$; et, comme d'habitude, on pose :

$$a = BC ; b = CA ; c = AB.$$

L'idée de base, très astucieuse, consiste à minorer la longueur MA par la hauteur du parallélogramme $B'C'C''B''$ correspondant au choix de $[B'C']$ pour base.

Question 18 :

- a) Justifier cette minoration, et exprimer la hauteur en question en fonction de l'aire du parallélogramme $B'C'C''B''$ et de la longueur a .
- b) Justifier que l'aire du parallélogramme $B'C'C''B''$ est la somme des aires des parallélogrammes $AB'B''M$ et $AC'C''M$.
- c) En déduire que : $MA \geq \frac{1}{a}(bMR + cMQ)$.

Un raisonnement similaire prouverait, bien entendu, que :

$$MB \geq \frac{1}{b}(cMP + aMR) \text{ et } MC \geq \frac{1}{c}(aMQ + bMP).$$

Question 19 :

En se souvenant du § 2, prouver que :

$$MA + MB + MC \geq 2(MP + MQ + MR).$$

Il serait dommage de quitter cette démonstration sans y ajouter deux remarques :

D'une part, quelle a été, au juste, la contribution de la symétrie par rapport à la bissectrice intérieure de $\hat{A}$? Autrement dit, n'aurait-on pas pu obtenir le même résultat en faisant jouer, dans le raisonnement, aux points B et C eux-mêmes le rôle qu'y ont tenu les points B' et C' ?

Question 20 :

- a) Comment aurait-il fallu redéfinir, en conséquence, les parallélogrammes considérés ?
- b) Montrer qu'on serait alors parvenu à :

$$MA + MB + MC \geq a\left(\frac{1}{b} + \frac{1}{c}\right)MP + b\left(\frac{1}{c} + \frac{1}{a}\right)MQ + c\left(\frac{1}{a} + \frac{1}{b}\right)MR.$$

- c) Montrer, par un exemple bien choisi, qu'il n'y a aucune raison "générale" pour que les coefficients $a\left(\frac{1}{b} + \frac{1}{c}\right), \dots$, soient ≥ 2 .

On voit donc qu'il aurait été beaucoup plus difficile de conclure sans l'intervention de cette symétrie.

Admettons un instant cette propriété, pour répondre à la question suivante :

Question 23 :

- a) Prouver que si l'égalité : $MA + MB + MC = (\frac{b}{c} + \frac{c}{b})MP + (\frac{c}{a} + \frac{a}{c})MQ + (\frac{a}{b} + \frac{b}{a})MR$ a lieu, alors M est le centre du cercle circonscrit au triangle ABC .
 b) En conclure que le cas où ABC est un triangle équilatéral de centre O est bien le seul "cas d'égalité".

Reste donc à prouver la propriété précédente; pour cela, soit A' le projeté orthogonal de A sur (BC) , et A_1 le point diamétralement opposé à A sur le cercle circonscrit au triangle ABC .

Figure 8

Figure 9

Question 24 :

- a) Comparer, à " $k\pi$ près", les angles de vecteurs suivants : $(\overrightarrow{AB}, \overrightarrow{AA'}); (\overrightarrow{BA_1}, \overrightarrow{BC}); (\overrightarrow{AA_1}, \overrightarrow{AC})$.
 b) En déduire que la symétrie par rapport à la bissectrice intérieure de $\hat{A}$ échange les droites (AA') et (AO) , et conclure.

5.— TROISIÈME DÉMONSTRATION DE L'INÉGALITÉ (E.M.)

Les notations sont fixées par la figure 10 :

Figure 10

L'INÉGALITÉ D'ERDÖS-MORDELL

La bissectrice intérieure de $\widehat{BMC}$ (resp. $\widehat{CMA}, \widehat{AMB}$) recoupe (BC) (resp. $(CA), (AB)$) en P', Q', R' ; on pose :

$$\begin{aligned} MA &= x ; MB = y ; MC = z \\ MP &= p ; MQ = q ; MR = r \\ MP' &= p' ; MQ' = q' ; MR' = r' \end{aligned}$$

ainsi que

$$a = BC ; b = CA ; c = AB.$$

$\widehat{BMC} = 2\alpha ; \widehat{CMA} = 2\beta ; \widehat{AMB} = 2\gamma$, de sorte qu'il s'agit de prouver que :
 $x + y + z \geq 2(p + q + r)$.

Nous avons vu en effet au paragraphe 3 qu'on pouvait supposer M distinct des sommets A, B, C du triangle, ainsi les angles $\widehat{BMC}, \widehat{CMA}, \widehat{AMB}$ sont-ils bien définis.

Question 25 :

Montrer qu'il suffit de prouver que :

$$x + y + z \geq 2(p' + q' + r').$$

Pour cela, nous allons d'abord calculer les longueurs p', q', r' en fonction des quantités $x, y, z, \alpha, \beta, \gamma$; il s'agit en fait de répondre à la question un peu plus générale suivante :

Question 26 :

On donne un triangle ABC ; la bissectrice intérieure de $\hat{A}$ recoupe (BC) en X : soit à calculer la longueur AX . Nous proposons trois méthodes :

a) (1ère méthode) : Commençons par rappeler que les bissectrices (intérieure et extérieure) de $\hat{A}$ sont les axes des symétries échangeant les droites (AB) et (AC) ; soit alors B' le symétrique de B par rapport à la bissectrice extérieure de $\hat{A}$:

Justifier les égalités :

$$B'B = 2c \sin \frac{\widehat{BAB'}}{2} ; AX = B'B \cdot \frac{CA}{CB'}$$

en conclure que : $AX = \frac{2bc}{b+c} \cos \frac{\hat{A}}{2}$.

b) (2ème méthode) : Rappelons que l'aire S d'un triangle ABC peut être donnée par : $S = \frac{1}{2}bc \sin \hat{A}$: quelle nouvelle expression de S cette formule donne-t-elle lorsqu'on divise le triangle ABC en les triangles ABX et AXC ? Retrouvez alors :

$$AX = \frac{2bc}{b+c} \cos \frac{\hat{A}}{2}.$$

c) (3ème méthode) : Rappelons (*) que X est le barycentre de $(B, b), (C, c)$: comment s'exprime, par conséquent, le vecteur $\overrightarrow{AX}$? Calculer alors le carré scalaire $\overrightarrow{AX}^2$, et retrouver

$$AX = \frac{2bc}{b+c} \cos \frac{\hat{A}}{2}.$$

d) (Un exemple d'application) : Y et Z désignant, de même, les pieds, sur (CA) et (AB) respectivement, des bissectrices intérieures de $\hat{B}$ et $\hat{C}$, prouver que :

$$a < b < c \implies AX > BY > CZ.$$

Cette question résolue, revenons à la démonstration entamée de l'inégalité (E.M.) ; les résultats obtenus entraînent :

$$p' + q' + r' = 2 \frac{yz}{y+z} \cos \alpha + 2 \frac{zx}{z+x} \cos \beta + 2 \frac{xy}{x+y} \cos \gamma.$$

Le paragraphe 2 va permettre une majoration de la somme $p' + q' + r'$.

Question 27 :

Démontrer que : $p' + q' + r' \leq \sqrt{yz} \cos \alpha + \sqrt{zx} \cos \beta + \sqrt{xy} \cos \gamma$ (on n'oubliera pas de s'interroger sur le signe de $\cos \alpha, \cos \beta, \cos \gamma$).

En déduire qu'il suffit désormais de prouver que : $2(\sqrt{yz} \cos \alpha + \sqrt{zx} \cos \beta + \sqrt{xy} \cos \gamma) \leq x + y + z$.

Pour cela, nous allons étudier le signe de la différence : $\mathcal{D} = x + y + z - 2\sqrt{yz} \cos \alpha - 2\sqrt{zx} \cos \beta - 2\sqrt{xy} \cos \gamma$, en observant qu'elle est aussi de la forme :

$$\mathcal{D} = X^2 + Y^2 + Z^2 - 2YZ \cos \alpha - 2ZX \cos \beta - 2XY \cos \gamma;$$

(pour quel choix de X, Y, Z ?); cette dernière forme se prêtera bien à l'étude du signe de $\mathcal{D}$, par une méthode qui s'inspire de la mise sous forme canonique des trinômes du second degré.

Exposons cette méthode sur l'exemple suivant : soit à étudier le signe de l'expression

$$E = X^2 + Y^2 + Z^2 - XY - YZ - ZX; \text{ en écrivant :}$$

$$E = X^2 - X(Y + Z) + Y^2 + Z^2 - YZ,$$

nous marquons que nous regardons E comme un "trinôme du second degré en la variable X ", que nous allons mettre sous sa forme canonique, comme il est naturel pour en étudier le signe :

$$E = \left(X - \frac{Y + Z}{2}\right)^2 - \left(\frac{Y + Z}{2}\right)^2 + Y^2 + Z^2 - YZ,$$

(*) Voir une démonstration dans l'ouvrage de l'IREM de Strasbourg "Les Maths en Pratique - Terminale CDE", éd. Bordas, p. 126 : Ensemble des points M tels que $\frac{MA}{MB} = k$.

L'INÉGALITÉ D'ERDÖS-MORDELL

soit, tous calculs faits : $E = (X - \frac{Y+Z}{2})^2 + \frac{3}{4}(Y - Z)^2$, ce que le lecteur est invité à vérifier ! On voit alors que l'expression E est toujours ≥ 0 .

Au lecteur de faire de même, maintenant, avec l'expression D .

Question 28 :

a) Que vaut la somme $2\alpha + 2\beta + 2\gamma$? En déduire que : $\cos \alpha + \cos \beta \cos \gamma = \sin \beta \sin \gamma$.

b) Présenter l'expression D , regardée comme un "trinôme du second degré en la variable X ", d'abord sous forme réduite et ordonnée, puis sous forme canonique ; en déduire que :

$$D = (X - Y \cos \gamma - Z \cos \beta)^2 + (Y \sin \gamma - Z \sin \beta)^2.$$

c) Quel est le signe de D ? En conclure que cette démonstration de l'inégalité (E.M.) est bien achevée.

Passons à présent à l'étude des cas d'égalité ; pour cela, commençons par résumer les étapes de la démonstration précédente ; il s'agit en fait de trois majorations successives :

$$\begin{aligned} 2(p + q + r) &\leq 2(p' + q' + r') \leq 2(\sqrt{yz} \cos \alpha + \sqrt{zx} \cos \beta + \sqrt{xy} \cos \gamma) \\ &\leq x + y + z. \end{aligned}$$

Question 29 :

Que peut-on dire de toutes ces inégalités "larges", s'il advient que : $2(p + q + r) = x + y + z$?

Cherchons donc à quelle condition $p + q + r = p' + q' + r'$.

Question 30 :

a) Que peut-on dire d'un triangle dont une bissectrice intérieure est aussi hauteur ?

b) En déduire que, si $p + q + r = p' + q' + r'$, M est le centre du cercle circonscrit au triangle ABC (ce que nous supposons désormais, de sorte que $x = y = z$).

c) Prouver qu'alors on a aussi : $p' + q' + r' = 2(\sqrt{yz} \cos \alpha + \sqrt{zx} \cos \beta + \sqrt{xy} \cos \gamma)$. (On relira la démonstration de l'inégalité : $p' + q' + r' \leq 2\sqrt{yz} \cos \alpha + \sqrt{zx} \cos \beta + \sqrt{xy} \cos \gamma$.)

Reste donc à chercher quand : $2(\sqrt{yz} \cos \alpha + \sqrt{zx} \cos \beta + \sqrt{xy} \cos \alpha) = x + y + z$, toujours en supposant que : $x = y = z$; pour cela, relire l'étape correspondante de la démonstration de l'inégalité, et voir que l'égalité se produit lorsque l'expression notée D est nulle.

Question 31 :

- a) Démontrer que si $2(\sqrt{yz} \cos \alpha + \sqrt{zx} \cos \beta + \sqrt{xy} \cos \gamma) = x + y + z$, alors $\beta = \gamma$.
- b) En déduire que si cette même égalité a lieu, le triangle ABC est équilatéral.
- c) En conclure que le seul cas où $x + y + z = 2(p + q + r)$ est celui où ABC est équilatéral de centre M , résultat qui achève ce paragraphe.

6.— ÉTUDE PARTICULIÈRE DES TRIANGLES RECTANGES ISO-CÈLES

Voici comment on peut reformuler l'inégalité (E.M.) : pour tout triangle ABC , soit m la valeur minimum du rapport $\frac{MA+MB+MC}{MP+MQ+MR}$, lorsque M parcourt l'intérieur du triangle : alors $m \geq 2$; pour un triangle équilatéral, $m = 2$, valeur atteinte au centre du triangle; pour d'autres types de triangles, il se peut très bien que : $m > 2$; nous nous proposons, dans ce paragraphe, de calculer m dans le cas particulier des triangles rectangles isocèles.

Dans ce qui suit, ABC est un triangle rectangle isocèle de sommet A ; on choisit, pour fixer les idées, la demi-diagonale $[BC]$ comme unité de distance; les points M dont il est question sont toujours intérieurs au triangle.

Question 32 :

Que sait-on des lignes de niveau de la fonction $M \rightarrow MP + MQ + MR$?

Par suite, dans un premier temps, nous chercherons le minimum du rapport $\frac{MA+MB+MC}{MP+MQ+MR}$ lorsque M décrit un segment $[B'C']$ parallèle à $[BC]$, défini, disons, par $MP = x$;

Figure 11

Il suffit donc en fait de chercher le minimum de la somme $MA + MB + MC$, lorsque M décrit $[B'C']$.

Question 33 :

a) Démontrer que cette somme est minimum lorsque M est le milieu de $(B'C')$ (indication : considérer séparément MA et $MB + MC$; pour cette dernière, penser aux symétriques de B et C par rapport à la droite $(B'C')$).

b) Etablir que, si M est le milieu du segment $[B'C']$, $\frac{MA+MB+MC}{MP+MQ+MR} = \frac{1-x+2\sqrt{1+x^2}}{x+\sqrt{2}(1-x)}$, expression que nous noterons, dans la suite, $f(x)$.

L'INÉGALITÉ D'ERDÖS-MORDELL

c) Entre quelles valeurs peut varier x ?

Tout revient donc, à présent, à chercher le minimum de la fonction

$$f : [0, 1] \rightarrow \mathbb{R}$$

$$x \rightarrow \frac{1 - x + 2\sqrt{1 + x^2}}{x + \sqrt{2}(1 - x)}$$

Question 34 :

a) Démontrer que, pour $x \in [0, 1]$, le signe de $f'(x)$ est aussi celui de l'expression $g(x)$ définie par :

$$g(x) = 2(\sqrt{2} - 1) + 2x\sqrt{2} - \sqrt{1 + x^2}.$$

b) Etudier le signe de $g(x)$, toujours pour $x \in [0, 1]$. (Deux méthodes nous paraissent possibles : traiter "élémentairement" la condition $g(x) > 0$ comme une inéquation irrationnelle, ou bien étudier les variations de g sur $[0, 1]$.)

c) En déduire le minimum cherché du rapport $\frac{MA+MB+MC}{MP+MQ+MR}$ (il sera rassurant, après tous ces calculs, de trouver une valeur légèrement supérieure à 2, ce qui est conforme à l'inégalité (E.M.)).